



IVS Poultry News



肉鸡舍的通风——保温浅析

肉鸡舍需要有良好的通风系统（足够的风机，合适的进风口），有条件的还应该安置水帘。另外保温的设施也应齐全（设计合理的火道，有足够的垫料，拉双层保温膜，配置保温灯）。只有在舒适的条件下，肉鸡才能正常的生长，同时可以避免一些疾病（家禽痛风、肉鸡腹水综合症，鸡慢性呼吸道）的发生。

如何处理好通风——保温这一矛盾体，是养好肉鸡的关键。由于肉鸡舍的通风与保温是由人的意志来控制，因此在判断这一对问题时会有偏差，尤其对于生手，往往掌握不好是吹多一点，还是停多一点。

在昆明地区，由于昼夜温差较大，可达 18℃，夜间温度可低至 12℃，而肉鸡舍的育雏温度在 26~34℃，这就要求饲养员在夜间提高温度，这样才有利于通风，保证舍内空气的新鲜。

在冬春季节，肉鸡养殖效益普遍不好，死亡率偏高，死的多是慢呼和腹水。究其原因，我认为是：①夜间保温不够，而使通风量过少，从而引发了呼吸道疾病 ②垫料不够 8-10 cm 厚，使鸡冷应激，导致腹水。

基于以上存在的问题，要搞好肉鸡的饲养管理须做到以下几点



IVS Poultry News



肉鸡舍的通风—保温浅析

① 饲养员应注意鸡只的变化并及时进行调温，若鸡只聚群、“叽叽”颤叫、缩头等，说明温度过低，应提高舍内温度；若出现张口喘气、照片2 要有观察地区，频繁喝水等，说明温度过高，应降低舍内温度(增加风机的使用，使温度控制在标准温度上下1度范围内)。② 铺设的垫料要有一定的厚度，一般在8-10 cm. 厘米；操作时尽量减少洒水，防止水线漏水，弄湿垫料会加快鸡体热量的流失；如果鸡舍内湿度过大会产生大量氨气，则应及时清除舍内粪便及潮湿的垫料。③ 使用吸氨除臭剂（硫酸亚铁、过磷酸、硫酸铜、熟石灰）来降低鸡舍的氨气浓度，并降低湿度。

แปล และเรียบเรียงโดย : น.สพ. เอกราช กุหลาบวงษ์

(编译员: 李云龙)